

# Срыгивания:



Обратный заброс содержимого желудка в ротовую полость

Нет причин для прекращения грудного вскармливания

Распространенная проблема, которой страдает более **50%** детей в возрасте 3-4 месяцев

Пик распространенности приходится на **4 месячный возраст ребенка**




Нет показаний для лекарственной терапии, если срыгивания не ухудшают параметры роста и развития ребенка

Научно доказано, что пробиотик *L. reuteri* DSM 17938 ускоряет опорожнение желудка и уменьшает частоту эпизодов срыгиваний

Частично гидролизованный белок быстрее эвакуируется из желудка (по сравнению с интактным белком), что может способствовать уменьшению частоты эпизодов срыгиваний

## Алгоритм ведения детей со срыгиваниями



Адаптировано, источник <sup>1</sup>Vandenplas et al., 2016

\*АБКМ – аллергия к белкам коровьего молока  
ИВ – искусственное вскармливание

\*\*CoMIS: метод определения связи между симптомами и применением детской смеси на основе коровьего молока (Vandenplas et al. PLoS One. 2018 Jul 18;13(7):e0200603)

\*\*\*Синдром Сандифера включает триаду симптомов: грыжу пищеводного отверстия диафрагмы, рефлюкс-эзофагит и кривошею, сочетающуюся с причудливой позой и произвольными «извивающимися» движениями шеи, головы и иногда туловища